Organisme Patogen pada Famili Varanidae dan Potensinya sebagai Penyakit Zoonosis

(Pathogenic Organisms in Varanidae and Their Potential as Zoonotic Diseases)

Syaiful Rizal dan RA Rahmawati

¹Pusat Penelitian Biologi LIPI, Jl. Raya Jakarta-Bogor KM. 46, Cibinong, Bogor 16911

²Mahasiswa Magister, Universitas Airlangga, Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115

Kontributor utama: drh.syaifulrizal@gmail.com

(Diterima 5 Februari 2021 – Direvisi 23 Maret 2021 – Disetujui 21 April 2021)

ABSTRACT

Monitor lizards have various body sizes, belong to the Varanidae and it is reported that there were various kinds of pathogenic organisms in their bodies. This review aims to describe various information on pathogenic organisms and their potential as zoonotic diseases and can be used as a reference in the prevention of zoonotic diseases originating from Varanidae. The results of this review discuss two types of viruses, three types of bacteria, five types of protozoa, two types of arthropods, and seven types of endoparasites that are pathogenic in Varanidae. Based on this information it is known that potentially zoonotic pathogens include bacteria group is *Salmonella* spp. and *Anaplasma phagocytophilum*; groups of protozoa was *Giardia* spp. and *Cryptosporidium* sp.; Arthropod group namely *Amblyomma* sp. which carries the bacteria *Rickettsia* sp., *Borrelia* spp. and *Anaplasma* spp. and the endoparasite group consisting of *Ascaris* sp., *Strongyloides* sp., Pentastomida, and *Angiostrongylus cantonensis*, while for the virus group, there were no pathogenic organisms with zoonotic potential. The extensive use of Varanidae by humans as exotic pets, as well as for consumption and medicine has great potential in the transmission of zoonotic diseases. Those are possible because the varanids non-aseptically environment. The proper handling and maintenance of monitor lizards are necessary to prevent the spread of zoonotic diseases. Unhygienic and less aseptic way of handling food products of animal origin can lead to the potential for transmission of pathogenic organisms (foodborne disease). Efforts to prevent the transmission of foodborne diseases can apply Good Hygienic Practices (GHP) with the process of cooking reptile meat for consumption. Besides, disease transmission can be prevented by implementing the One Health concept.

Key words: Varanidae, zoonotic, organism, pathogen, One Health

ABSTRAK

Biawak memiliki ukuran tubuh yang bervariasi, termasuk ke dalam famili Varanidae dan dilaporkan terdapat berbagai macam organisme patogen pada tubuhnya. Tujuan dari ulasan ini adalah menguraikan berbagai informasi terkait organisme patogen serta potensinya sebagai penyakit zoonosis dan dapat dijadikan rujukan dalam hal pencegahan penyakit zoonosis yang berasal dari Varanidae. Dari hasil ulasan ini dibahas dua jenis virus, tiga jenis bakteri, lima jenis protozoa, dua jenis arthropoda, dan tujuh jenis endoparasit yang patogen pada Varanidae. Berdasarkan informasi tersebut diketahui bahwa organisme patogen yang berpotensi zoonosis antara lain dari kelompok bakteri adalah *Salmonella* spp. dan *Anaplasma phagocytophilum*; kelompok protozoa yaitu *Giardia* spp. dan *Cryptosporidium* sp.; kelompok Arthropoda yaitu *Amblyomma* sp. yang membawa bakteri *Rickettsia* sp., *Borrelia* spp. dan *Anaplasma* spp. serta kelompok endoparasit terdiri dari *Ascaris* sp., *Strongyloides* sp., Pentastomida, dan *Angiostrongylus cantonensis*, sedangkan untuk kelompok virus tidak ada organisme patogen yang berpotensi zoonosis. Pemanfaatan Varanidae yang sangat luas oleh manusia sebagai hewan peliharaan eksotik, maupun untuk konsumsi dan obat memiliki potensi yang besar dalam transmisi penyakit zoonosis. Hal ini memungkinkan karena lingkungan hidup Varanidae yang tidak bersih. Penanganan dan pemeliharaan biawak yang tepat perlu dilakukan guna mencegah penyebaran penyakit zoonosis. Cara penanganan produk pangan asal hewan yang kurang higienis dan kurang aseptis dapat menyebabkan potensi penularan organisme patogen (*foodborne disease*). Upaya pencegahan penularan dari *foodborne disease* dapat menerapkan *Good Hygienic Practices* (GHP) dengan proses pemasakan daging reptil yang akan dikonsumsi. Selain itu, penularan penyakit dapat dicegah dengan implementasi konsep *One Health*.

Kata kunci: Varanidae, zoonosis, organisme, patogen, *One Health*

PENDAHULUAN

Biawak termasuk ke dalam anggota famili Varanidae memiliki ciri ukuran tubuh yang bervariasi,

mulai dari ukuran yang paling kecil yaitu *Varanus sparnus* dengan panjang 23 cm hingga *Varanus komodoensis* dengan panjang mencapai 3 meter (Auliya & Koch 2020). Terdapat 81 jenis biawak di

dunia yang telah diidentifikasi dan termasuk ke dalam genus *Varanus*, dibagi ke dalam 11 subgenus berdasarkan karakter morfologi dan molekulernya (Auliya & Koch 2020). Habitat dan persebarannya cukup luas meliputi benua Afrika, Semenanjung Arab, Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, serta di Kepulauan Indo-Australia, dan beberapa kepulauan di sekitar Samudra Pasifik (Koch et al. 2013).

Keberadaan spesies dari famili Varanidae yang tersebar luas tidak hanya berada di alam liar atau di lingkungan penangkaran saja, tetapi juga banyak dijadikan sebagai binatang peliharaan seperti biawak air (*Varanus salvator*) (Nurkarimah et al. 2020). *Varanus salvator* merupakan spesies biawak yang cukup populer di Indonesia dan status konservasinya termasuk ke dalam appendix II CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) menyebabkan *V. salvator* banyak diperdagangkan tidak hanya sebagai hewan peliharaan eksotik tetapi juga dikonsumsi oleh masyarakat di desa Cisiuh dan Muarabinangeun, Provinsi Banten, Indonesia dengan cara disate dan dipanggang (Uyeda et al. 2014) seperti halnya spesies biawak India (*V. bengalensis*) yang juga kerap dikonsumsi oleh masyarakat India (Johnny et al. 2018). Bahkan beberapa masyarakat percaya bahwa daging biawak memiliki berbagai khasiat untuk mengobati berbagai penyakit kulit, asma (Uyeda et al. 2014), serta afrodisiaka dan luka bakar (Nijman 2016).

Interaksi yang erat antara manusia dengan spesies dari Varanidae memiliki potensi terjadinya penularan penyakit zoonosis. Hal ini sangat dimungkinkan karena lingkungan dari spesies pada famili Varanidae yang tidak bersih dan sehat. Beberapa penelitian telah melaporkan beberapa organisme patogen yang dapat menginfeksi famili Varanidae seperti *Pentastomida* dan *Angiostrongylus cantonensis* yang dapat menyebabkan penyakit berat pada manusia (Subroto et al. 2020; Johnny et al. 2018). Oleh sebab itu diperlukan kewaspadaan oleh dokter hewan, masyarakat penikmat kuliner ekstrim, dan pencinta hewan eksotik dari famili Varanidae khususnya dalam hal penanganan ketika akan dikonsumsi dan dipelihara oleh manusia.

Artikel ini bertujuan untuk menguraikan berbagai informasi terkait organisme patogen pada Varanidae serta potensinya sebagai penyakit zoonosis sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan dalam hal pencegahan penyakit zoonosis yang berasal dari Varanidae.

PEMANFAATAN SPESIES FAMILI VARANIDAE

Pemanfaatan biawak telah lama dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di seluruh dunia antara lain di Indonesia, Pakistan dan India. Salah satu daerah di Indonesia yang memanfaatkan biawak yaitu di desa

Cisiuh dan Muarabinangeun, Provinsi Banten, Jawa Barat. Masyarakat di desa tersebut mengonsumsi daging biawak air (*V. salvator*) yang dipercaya dapat mengobati penyakit kulit (gatal-gatal), panu, kurap, eksim, dan koreng serta gejala asma. Selain untuk dikonsumsi, ekstrak minyak dari *V. salvator* dipercaya efektif mengurangi bekas luka yang diberikan secara topikal (Uyeda et al. 2014).

Khasiat minyak dan lemak dari biawak (*V. bengalensis*) juga dimanfaatkan oleh suku-suku di Pakistan sebagai salep untuk infeksi kulit dan menghilangkan nyeri rematik (Hashmi et al. 2013). Berbeda halnya di India, daging *V. bengalensis* yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat dipercaya dapat membantu meningkatkan kinerja paru-paru akibat kekurangan oksigen, serta serbuk daging *V. bengalensis* digunakan sebagai tonik untuk penyembuhan asma (Subramanean & Reddy, 2012).

Varanidae tidak hanya dimanfaatkan sebagai daging konsumsi karena dipercaya memiliki berbagai khasiat, namun juga dijadikan sebagai hewan peliharaan eksotik yang diperdagangkan secara internasional. Beberapa spesies yaitu *Varanus macreii* (Bennett 2015) dan *Varanus bitatawa* (Emerson 2012) telah diperdagangkan. Menurut Bennett (2015) Indonesia menjadi negara eksportir *V. macreii* terbesar ke beberapa negara di Benua Amerika hingga Afrika.

ORGANISME PATOGEN PADA FAMILI VARANIDAE

Virus

Virus yang dapat menginfeksi spesies Varanidae adalah *Atadenovirus* (Huminto & Agungpriyono 2008; Ball 2015) dan *Varanid herpesvirus* (Hughes-Hanks et al. 2010; Wellehan et al. 2005) (Tabel 1). *Atadenovirus*, salah satu genus dari adenovirus, merupakan virus patogen yang paling umum ditemukan pada reptil meliputi kadal dan ular (Ball 2015; Hyndman et al. 2019; Péntzes et al. 2020). Selain mudah ditemukan pada jenis kadal dan ular, virus ini juga terdeteksi pada berbagai spesies unggas (termasuk bebek) dan ruminansia serta marsupial (Péntzes et al. 2020). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ball (2015), pada *V. salvator* yang menderita infeksi atadenovirus ditemukan gejala seperti anoreksia, tubuh kurus, dehidrasi, *proscissus spinosus* menonjol, mata cekung, keriput, kemerahan di sekitar mulut dan gingiva, kulit terkelupas dan terdapat plak kuning. Umumnya atadenovirus pada reptil bersifat subklinis (Kubiak 2013), namun demikian infeksi sangat destruktif terutama pada saluran pencernaan, hepar, limpa (Huminto & Agungpriyono 2008) yang

Tabel 1. Virus yang ditemukan pada Varanidae

Virus	Varanidae yang terinfeksi	Negara (sumber)	Sampel	Metode deteksi	Referensi
<i>Atadenovirus</i> ^M	<i>V. salvator</i>	Indonesia (penangkaran)	Karkas	Mikroskop	Huminto & Agungpriyono 2008
	<i>V. salvator</i> , <i>V. euprepisaurus macraei</i>	Jerman (liar)	Jaringan usus, kulit, liver, paru-paru, GIT, kepala, jantung, ginjal, otak	PCR	Ball 2015
<i>Varanid herpesvirus</i> ^M	<i>Varanus</i> spp.	Amerika Serikat (peliharaan)	Usus halus dan liver	Mikroskop & PCR	Hughes-Hanks et al. 2010
	<i>V. prasinus</i>	Amerika Serikat (penangkaran)	Jaringan gingival	DNA <i>in situ</i> hybrid	Wellehan et al. 2005

M: Virus mampu menginfeksi beberapa host selain dari famili Varanidae

menyebabkan hepatitis, esofagitis, enteritis, splenitis, dan ensefalopati (Hyndman & Shilton 2011). Potensi zoonosis dan penularan antar *host* spesies dari atadenovirus belum pernah dilaporkan, hal ini berkaitan dengan spektrum *host* yang luas dari atadenovirus, sehingga tidak ada hubungan filogenetik antar spesies dalam genus atadenovirus (Prado-irwin et al. 2018).

Metode deteksi *Atadenovirus* oleh Huminto & Agungpriyono (2008) adalah metode mikroskopis, sampel (mukosa saluran pencernaan, limpa, dan liver) dipreparasi dengan pewarnaan Hematoxylin-Eosin (HE) kemudian diamati dengan mikroskop. Hasil pengamatan tersebut ditemukan lesi peradangan multifokal nekrosis di berbagai jaringan sampel. Sedangkan, metode deteksi yang digunakan oleh Ball (2015) menggunakan metode *Polymerase Chain Reaction* (PCR) dengan target gen *Atadenovirus*.

Virus lain yang ditemukan pada famili Varanidae adalah Herpesvirus. Herpesvirus merupakan virus yang memiliki rentang *host* yang cukup beragam meliputi berbagai macam mamalia, ikan, amfibi, dan reptil (Hughes-Hanks et al. 2010). Infeksi virus tersebut bermanifestasi menjadi tahap laten dengan gejala akut dan dapat muncul kembali ketika sistem imun *host* menurun. Herpesvirus pada reptil termasuk dalam subfamili Alphaherpesvirinae bersama dengan herpesvirus mamalia dan unggas (Ariel 2011; Marschang 2011). Virus ini terdeteksi menyebabkan lesi di mukosa mulut dan otak *V. prasinus* dengan stomatitis proliferasi (Wellehan et al. 2005).

Varanid herpesvirus merupakan jenis virus yang patogen pada famili Varanidae (Wellehan et al. 2005). Belum ditemukan laporan adanya potensi zoonosis dari virus tersebut ke manusia maupun ke spesies lain dalam satu subfamili (mamalia dan unggas), namun potensi zoonosis masih memungkinkan dapat terjadi (Woźniakowski & Samorek-salamonowicz 2015).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Hughes-Hanks et al. (2010), infeksi *Varanid herpesvirus*

diketahui menggunakan observasi mikroskop elektron dan didapatkan multifokal nekrosis pada jaringan sampel usus halus dan liver. Kemudian dilanjutkan dengan uji PCR dan didapatkan hasil sekuens memiliki kemiripan dengan *Varanid herpesvirus* (80% nukleotida dan 82% asam amino). Pada pengamatan DNA *in situ hybridization* oleh Wellehan et al. (2005) didapatkan hasil positif *Varanid herpesvirus*.

Bakteri

Pada famili Varanidae ditemukan tiga jenis bakteri yaitu: *Morganella morganii* (Shin et al. 2009), *Anaplasma phagocytophilum* (Koh et al. 2018), *Salmonella* spp. (Arnafia et al. 2016; Barboza et al. 2018) dimana spesies yang dilaporkan yaitu *Salmonella enterica* (Bzdil et al. 2017) yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Morganella morganii merupakan bakteri flora normal yang ditemukan di saluran pencernaan dan feses manusia, mamalia, unggas dan reptil (Shin et al. 2009). Menurut Jho et al. (2011), *M. morganii* juga ditemukan pada swab oral dan kloaka *python burma* (*Python molurus bivittatus*).

Pada manusia, bakteri tersebut akan menginfeksi saat imunitas *host* menurun dan menyebabkan sepsis, pneumonia, infeksi saluran kemih, infeksi sistem saraf, dll (Shin et al. 2009). Pada *V. salvator* yang terinfeksi *Morganella morganii* dilaporkan memiliki gejala seperti anoreksia, letargi dan depresi. Hasil yang ditemukan dari isolasi ginjal dan darah *V. salvator* yaitu adanya infeksi bakteri *Morganella morganii* penyebab utama septicemia (Shin et al. 2009).

Berbeda halnya dengan *M. morganii*, *Salmonella* spp. merupakan patogen zoonosis yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Reptil memiliki peran sebagai reservoir *Salmonella* spp., tidak hanya menyebabkan infeksi saluran intestinal saja tetapi juga pada organ lain dan umumnya tidak bergejala (Arnafia et al. 2016). Namun demikian,

Tabel 2. Bakteri yang ditemukan pada Varanidae

Bakteri	Varanidae yang terinfeksi	Negara (sumber)	Sampel	Metode deteksi	Referensi
<i>Morganella morganii</i> ^M	<i>V. salvator</i>	Korea Selatan (kebun binatang)	Swab ginjal & darah	PCR	Shin et al. 2009
<i>Salmonella</i> spp. ^{Z,M}	<i>V. salvator</i> , <i>V. salvadorii</i>	Indonesia (peliharaan)	Swab kloaka	PCR	Arnafia et al. 2016
<i>Salmonella enterica</i> ^{Z,M}	<i>V. exanthematicus</i>	Canada (penangkaran)	Jaringan mulut, mata	CT scan & kultur bakteri	Barboza et al. 2018
	<i>V. exanthematicus</i>	Ceko (peliharaan)	Jantung, paru, liver, usus	PCR	Bzdil et al. 2017
<i>Anaplasma phagocytophilum</i> ^Z	<i>V. salvator</i>	Malaysia (liar)	Darah	PCR	Koh et al. 2018

Z: Potensi zoonosis; M: Bakteri mampu menginfeksi beberapa host selain famili Varanidae

penelitian yang dilakukan oleh Bzdil et al. (2017) menunjukkan gejala mual, diare, letargi, dan kehilangan nafsu makan sebelum ditemukan mati. Gejala lain dari infeksi *Salmonella* spp. dilaporkan oleh Barboza et al. (2018) yaitu terdapat pembengkakan wajah sisi kiri dan tidak ada perubahan perilaku dari *V. exanthematicus*.

Bakteri *Salmonella* spp. dapat ditularkan melalui kontak langsung dengan reptil atau secara tidak langsung dari lingkungan yang terkontaminasi feses reptil yang terinfeksi (Tomastikova et al. 2017). Keberadaan *Salmonella* spp. pada reptil terutama sebagai hewan peliharaan akan meningkatkan resiko penularan bakteri ke manusia. Infeksi *Salmonella* spp. pada manusia yang disebut Salmonellosis, menyebabkan gejala umum demam dan diare hingga pada beberapa kasus dapat berkembang menjadi penyakit dengan bakteremia, meningitis, kolitis, gastroenteritis terutama pada kelompok usia anak-anak (Murphy & Oshin 2015; Pees et al. 2013).

Bakteri *Anaplasma phagocytophilum* yang sering ditemukan pada famili Varanidae (Lin et al. 2011) merupakan bakteri gram-negatif intraselular obligat yang ditularkan melalui kutu, famili Anaplasmataceae (Koh et al. 2018) dan menjadi penyebab utama penyakit anaplasmosis granulositik pada hewan dan manusia (Nowak et al. 2010). Infeksi yang disebabkan oleh bakteri ini dapat menyerang leukosit pada manusia dan dapat menyebabkan kematian.

Metode deteksi untuk mengidentifikasi bakteri *M. morganii* (Shin et al. 2009), *Salmonella* spp., (Arnafia et al. 2016), *Salmonella enterica* (Bzdil et al. 2017), dan *Anaplasma phagocytophilum* (Koh et al. 2018) menggunakan uji PCR, sedangkan pada *Salmonella enterica* (Barboza et al. 2018) digunakan metode *Computed Tomography* (CT) Scan dan kultur bakteri. Dari gambaran CT scan pada kepala *V. exanthematicus* terdapat massa memanjang dari retrobulbar kiri ke otod temporal dengan lesi ekstensif dari tulang epiterygoid

sehingga mengakibatkan kompresi batang otak, rongga mulut dan mata bagian kiri. Kemudian dilakukan konfirmasi lebih lanjut mengenai bakteri yang menginfeksi *V. exanthematicus* dengan kultur bakteri dan didapatkan hasil positif *Salmonella enterica* (Barboza et al. 2018).

Protozoa

Lima jenis protozoa yang menginfeksi Varanidae (Tabel 3) dan salah satunya yaitu *Haemogregarina* sp. merupakan hemoparasit protozoa yang umum menginfeksi reptil. Infeksi parasit ini ditularkan melalui *intermediate host* seperti lintah, kutu, nyamuk, dan tungau (O'Donoghue 2017). Potensi penularan *Haemogregarina* sp. dari reptil ke manusia belum pernah dilaporkan dan reptil yang terinfeksi *Haemogregarina* sp. umumnya tidak menimbulkan gejala klinis dan mampu beradaptasi dengan baik (Scheelings & Jessop 2011), namun reptil dengan tingkat parasitemia yang tinggi dapat mengalami anemia, lemas dan anoreksia (Nurkarimah et al. 2020). Metode deteksi untuk mengkonfirmasi adanya protozoa *Haemogregarina* sp. dilakukan dengan pengamatan secara mikroskopik, terdapat gamont *Haemogregarina* sp. berbentuk lonjong seperti sosis yang terletak dalam eritrosit *V. salvator* dengan inti parasit berwarna gelap (Nurkarimah et al. 2020).

Eimeria adalah protozoa obligat parasit yang memiliki spektrum *host* sangat luas termasuk mamalia, burung, reptil, ikan dan amfibi (Blake 2015). Penyebaran parasit ini dipengaruhi oleh suhu, kelembaban, dan kebersihan lingkungan (Nurkarimah et al. 2020). Lingkungan hidup reptil yang kurang bersih, meningkatkan resiko infeksi dari *Eimeria* spp.. Parasit *Eimeria* spp. merupakan parasit gastrointestinal dari kelompok protozoa penyebab penyakit koksidirosis pada reptil dan tidak bersifat zoonosis terhadap

manusia (Indraswari et al. 2017; Nurkarimah et al. 2020). Metode deteksi *Eimeria* sp. (Nurkarimah et al. 2020) menggunakan mikroskop dengan sampel feses, ditunjukkan adanya ookista yang telah bersporulasi menjadi empat sporokista dan berbentuk ovoid. Sejalan dengan hal tersebut, pengamatan mikroskopis yang dilakukan oleh Abdel-Aziz et al. (2019) juga tampak dengan jelas perkembangan siklus hidup *Eimeria* sp. dari tahapan eksogenus hingga tahap endogenus (merogonik dan gamogonik) pada feses dan epitel usus *V. griseus griseus*.

Giardia sp. yang ditemukan pada feses *V. bengalensis* memiliki potensi zoonosis (Nurkarimah et al. 2020) penyebab giardiasis pada hewan maupun manusia (Bhadesiya et al. 2017). Infeksi *Giardia* sp. ditransmisikan melalui rute fecal-oral akibat menelan secara langsung maupun tidak langsung kista *Giardia* sp. Gejala infeksi bervariasi dari subklinis hingga adanya gejala diare akut, mual, nyeri epigastrium, penurunan berat badan dan malabsorpsi (Hooshyar et al. 2019). Pengamatan secara mikroskop dilakukan oleh Bhadesiya et al. (2017) untuk melihat adanya infeksi *Giardia* sp. pada sampel feses *V. bengalensis* dan dari hasil pengamatan menunjukkan positif adanya kista *Giardia* sp. Namun hingga saat ini belum ditemukan adanya laporan giardiasis pada manusia yang ditularkan oleh reptil maupun biawak.

Entamoeba invadens adalah protozoa komensal yang hidup di saluran gastrointestinal reptil herbivora, namun pada reptil karnivora (kadal dan ular) dapat menyebabkan kerusakan mukosa usus yang mengakibatkan pendarahan enteritis, kolitis, dan hepatitis (Michaely et al. 2020). Infeksi *E. invadens* yang dilaporkan oleh Chia et al. (2009) menunjukkan gejala anoreksia dan regurgitasi. Gejala lain yang kemungkinan terjadi adalah dehidrasi, diare, kejang hingga menyebabkan kematian mendadak. Belum ada temuan terkait potensi zoonosis *E. invadens*, namun infeksi organisme ini sangat menular dan dapat

menyebarkan dengan cepat ke spesies lain (Shilton et al. 2018; Michaely et al. 2020) Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Nikousefat et al. (2014) melaporkan infeksi *E. invadens* pada iguana hijau menyebabkan anemia dan heterofilik leukositosis dengan gejala kelemahan dan letargi.

Metode deteksi adanya *Entamoeba invadens* yang dilakukan oleh Chia et al. (2009) dengan pemeriksaan histopatologi pada *V. salvator* terinfeksi. Pada sampel otot rangka *V. salvator*, terlihat bahwa infeksi yang menyebar sangat parah ditandai dengan penggabungan multifokal nekrosis dan granulomatosus miositis disertai lesi yang bervariasi dan mengandung trophozoit *amoebic* ovoid. Pada liver tampak multifokal nekrosis dengan ukuran bervariasi yang mengandung trophozoit *amoebic* mirip dengan yang terlihat di otot rangka.

Salah satu protozoa yang dilaporkan dapat menginfeksi Varanidae dan memiliki potensi zoonosis yaitu *Cryptosporidium* sp. Terdapat dua genus yang dikenali di reptil yaitu *C. serpentis* dan *C. varanii* (Ryan et al. 2014). *Cryptosporidium* sp. merupakan salah satu parasit usus penyebab diare pada hewan dan manusia yang bersifat oportunistik. Pada *V. albigularis ionidesi*, infeksi *Cryptosporidium* spp. menyebabkan gejala klinis diare, hipersalivasi, muntah, anoreksia, letargi, serta anemia (Ryan & Hijjawi 2015), sedangkan pada manusia infeksi *Cryptosporidium* spp. dapat menyebabkan diare akut hingga kronis (Maryanti 2017) tergantung status imun yang berdampak terhadap keparahan dan lama infeksi. Pada manusia yang imunokompeten, diare tidak berlangsung lama (kurang dari 2 minggu), sedangkan pada individu dengan defisiensi imun (*immunocompromised*), infeksi yang sama akan menjadi progresif, berlangsung lama bahkan dapat menyebabkan kematian (Eibach et al. 2015; Sparks et al. 2015). Metode deteksi *Cryptosporidium* sp. yang dilakukan oleh Pavlasek & Ryan (2008) adalah dengan uji PCR.

Tabel 3. Protozoa yang ditemukan pada Varanidae

Protozoa	Varanidae yang terinfeksi	Negara (sumber)	Sampel	Metode deteksi	Referensi
<i>Haemogregarina</i> sp. ^M	<i>V. salvator</i>	Indonesia (liar)	Darah	Mikroskop	Nurkarimah et al. 2020
<i>Eimeria</i> sp. ^M	<i>V. salvator</i>	Indonesia (liar)	Feses	Mikroskop	Nurkarimah et al. 2020
	<i>V. griseus griseus</i>	Mesir (liar)	Feses dan epitel usus	Mikroskop	Abdel-Aziz et al. 2019
<i>Giardia</i> spp. ^{Z,M}	<i>V. bengalensis</i>	India (liar)	Feses	Mikroskop	Bhadesiya et al. 2017
<i>Entamoeba invadens</i> ^M	<i>V. salvator</i>	Taiwan (kebun binatang)	Organ	Histopatologi	Chia et al. 2009
<i>Cryptosporidium</i> sp. ^Z	<i>V. griseus</i>	Australia (kebun binatang)	Feses	PCR	Pavlasek & Ryan 2008

Z: Potensi zoonosis; M: Bakteri mampu menginfeksi beberapa *host* selain famili Varanidae

Arthropoda

Terdapat dua arthropoda yang ditemukan pada famili Varanidae yaitu: *Aponomma* sp. (Amelia et al. 2020) dan *Amblyomma* sp. (Hanafiah et al. 2018; Amelia et al. 2020) dimana spesies dari *Amblyomma* yang ditemukan antara lain *A. varanese* (Supriyono et al. 2019), *A. gervaisi* (Bhadesiya et al. 2017), *A. helvolum* (Doornbos et al. 2013), *A. flavomaculatum* (Nowak et al. 2010), dan *A. exornatum* (Reeves et al. 2006) yang dapat dilihat pada Tabel 4.

Dari beberapa penelitian yang telah dilaporkan, manifestasi arthropoda *Aponomma* sp. dan *Amblyomma* sp. ditemukan di berbagai spesies Varanidae, sering ditemukan di bagian pangkal leher dan kaki, perut, sedangkan bagian punggung dan ekor sedikit ditemukan kedua arthropoda tersebut disebabkan sering terpapar matahari (Amelia et al. 2020). Gejala yang ditemukan pada Varanidae yang terinfestasi arthropoda tersebut antara lain kekurangan darah, iritasi kulit, alergi sehingga hewan terinfestasi akan cenderung mencakar atau menggigit kulit karena gatal akibat arthropoda (Hanafiah et al. 2018).

Arthropoda dapat menularkan virus, bakteri dan parasit. Banyak infeksi yang ditularkan bersifat zoonosis, sehingga beradaptasi untuk menularkan dari

manusia ke manusia secara langsung, sehingga menjadikan arthropoda sebagai kontributor munculnya beberapa penyakit menular (Nabarro et al. 2020). Bakteri yang dapat ditularkan oleh kutu antara lain *Borrelia* spp. (Kaenkan et al. 2020; Supriyono et al. 2019), *Rickettsia* spp. (Reeves et al. 2006; Doornbos et al. 2013; Supriyono et al. 2019) dan *Anaplasma* spp. (Nowak et al. 2010; Supriyono et al. 2019). Ketiga bakteri tersebut dapat menyebabkan penyakit berat, seperti *Rickettsia* spp. menyebabkan penyakit sistemik (*typhus*, *spotted fever*), *Borrelia* spp. mempengaruhi sistem imun, dan *Anaplasma* spp. menyebabkan anaplasmosis pada manusia.

Metode deteksi yang dilakukan untuk menentukan adanya *Aponomma* sp. (Amelia et al. 2020), *Amblyomma* sp. (Hanafiah et al. 2018; Amelia et al. 2020), *Amblyomma gervaisi* (Bhadesiya et al. 2017) adalah dengan pengamatan mikroskop, sedangkan untuk mengkonfirmasi adanya *Amblyomma* sp. (Kaenkan et al. 2020), *Amblyomma varanese* (Supriyono et al. 2019), *Amblyomma helvolum* (Doornbos et al. 2013), *Amblyomma flavomaculatum* (Nowak et al. 2010), dan *Amblyomma exornatum* (Reeves et al. 2006) adalah dengan deteksi menggunakan PCR.

Tabel 4. Arthropoda yang ditemukan pada Varanidae

Arthropoda	Organisme patogen yang dibawa	Spesies Varanidae	Negara (sumber)	Sampel	Metode deteksi	Referensi
<i>Aponomma</i> sp.	Tidak dibahas	<i>V. salvator</i>	Indonesia (liar)	Kulit	Mikroskop	Amelia et al. 2020
<i>Amblyomma</i> sp.	Tidak dibahas	<i>V. salvator</i>	Indonesia (liar)	Kulit	Mikroskop	Hanafiah et al. 2018; Amelia et al. 2020
	<i>Borrelia</i> spp. ^Z	<i>V. salvator</i> , <i>V. bengalensis</i>	Thailand (liar)	Whole	PCR	Kaenkan et al. 2019
<i>Amblyomma varanese</i>	<i>Anaplasma</i> spp. ^Z <i>Rickettsia</i> spp. ^Z <i>Borrelia</i> spp. ^Z	<i>V. salvator</i>	Indonesia (liar)	Kelenjar saliva dan usus	PCR	Supriyono et al. 2019
<i>Amblyomma gervaisi</i>	Tidak dibahas	<i>V. bengalensis</i>	India (liar)	Kulit	Mikroskop	Bhadesiya et al. 2020
<i>Amblyomma helvolum</i>	<i>Rickettsia</i> spp. ^Z	<i>V. salvator</i>	Thailand (liar)	Whole	PCR	Doornbos et al. 2013
<i>Amblyomma flavomaculatum</i>	<i>Anaplasma phagocytophilum</i> ^Z	<i>V. exanthematicus</i>	Polandia (impor)	Whole	PCR	Nowak et al. 2010
<i>Amblyomma exornatum</i>	<i>Rickettsia</i> spp.	<i>V. olivaceus</i>	Amerika Serikat (penangkaran)	Whole	PCR	Reeves et al. 2006

Z: Potensi zoonosis; M: Bakteri mampu menginfeksi beberapa host selain famili Varanidae

Tabel 5. Endoparasit yang ditemukan pada Varanidae

Endoparasit	Varanidae yang terinfeksi	Negara (sumber)	Sampel	Metode deteksi	Referensi
<i>Ascaris</i> sp. ^{Z, M}	<i>V. salvator</i>	Indonesia (liar)	Feses	Mikroskop	Hanafiah et al. 2018
<i>Strongyloides</i> sp. ^Z	<i>V. salvator</i>	Indonesia (liar)	Feses	Mikroskop	Hanafiah et al. 2018
Pentastomida ^Z	<i>V. salvator</i>	Indonesia (liar)	Paru-paru	Mikroskop	Subroto et al. 2020
<i>Tanqua tiara</i>	<i>V. salvator</i>	Indonesia (liar)	Lambung	Mikroskop	Agustin et al. 2017
<i>Physaloptera</i> sp.	<i>V. bengalensis</i>	India (penangkaran)	Rongga perut	Mikroskop	Manjunatha et al. 2020
<i>Duthiersia expansa</i>	<i>V. salvator</i>	Indonesia (liar)	Usus	Mikroskop	Putri et al. 2020
<i>Angiostrongylus cantonensis</i> ^{Z, *}	<i>V. bengalensis</i>	India (makanan)	Darah	Tes serologi	Johnny et al. 2018

Z: Potensi zoonosis; M: Bakteri mampu menginfeksi beberapa host selain famili Varanidae

* : kasus yang ditemukan di manusia dari transmisi makanan

Endoparasit

Pada Tabel 5 menunjukkan berbagai endoparasit yang dilaporkan menginfeksi berbagai spesies dari famili Varanidae. Lingkungan hidup Varanidae khususnya *V. salvator* yang berada di sekitar perairan seperti rawa dan selokan, sangat memungkinkan terjadi infestasi endoparasit dari air yang tercemar. Beberapa endoparasit yang ditemukan dapat bersifat zoonosis seperti *Ascaris* sp. (Nejsun et al. 2012; Widisuputri et al. 2020), *Strongyloides* sp. (Jaleta et al. 2017), Pentastomida (Cho et al. 2017; Galecki et al. 2016), *Angiostrongylus cantonensis* (Maldonado Junior et al. 2020), namun terdapat pula endoparasit yang tidak bersifat zoonosis seperti *Tanqua tiara*. Meskipun demikian, semua spesies endoparasit berpotensi menular ke manusia. Johnny et al. (2018) melaporkan infestasi endoparasit *Angiostrongylus cantonensis* pada manusia setelah mengkonsumsi daging *V. bengalensis*, meskipun sangat jarang terjadi, dengan gejala klinis antara lain demam tinggi, sakit kepala, mual selama 10 hari. Dari pemeriksaan serologi diketahui penderita tersebut mengalami *eosinophilic* meningitis.

Metode pemeriksaan untuk mengetahui adanya endoparasit *Ascaris* sp. dan *Strongyloides* sp. (Hanafiah et al. 2018), Pentastomida (Subroto et al. 2020), *Tanqua tiara* (Agustin et al. 2017), *Physaloptera* sp. (Manjunatha et al. 2020), dan *Duthiersia expansa* (Putri et al. 2020) menggunakan mikroskop menggunakan sampel feses (*Ascaris* sp. dan *Strongyloides* sp.), paru-paru (Pentastomida), lambung (*Tanqua tiara*), rongga perut (*Physaloptera* sp.) dan usus (*Duthiersia expansa*), sedangkan pemeriksaan *Angiostrongylus cantonensis* (Johnny et al. 2018) menggunakan tes serologi pada darah manusia yang terinfeksi endoparasit tersebut.

PENCEGAHAN PENULARAN ZOONOSIS DARI VARANIDAE

Pemanfaatan reptil khususnya biawak untuk konsumsi dan obat-obatan serta tingginya interaksi dengan manusia memiliki potensi penularan penyakit zoonosis dikarenakan memiliki berbagai organisme patogen (virus, bakteri, protozoa, endoparasit) di dalam tubuhnya. Penularan zoonosis secara umum dapat melalui beberapa cara yaitu: kontak langsung, kontak tidak langsung melalui vektor (*vector borne*), dan melalui pangan asal hewan sakit (*foodborne disease*) (Biru et al. 2018).

Foodborne disease disebabkan oleh kontaminasi makanan yang bersumber dari mikroba termasuk bakteri, protozoa, virus, dan fungi (Odeyemi 2016). Faktor utama yang berkontribusi dalam kontaminasi tersebut adalah penanganan pangan yang tidak tepat dan kurangnya kesadaran hidup bersih saat penyiapan ataupun saat mengonsumsi makanan. Penerapan sistem *Good Hygienic Practices* (GHP) sangat penting untuk mengendalikan bahaya *foodborne disease* ini. Pengurangan potensi bahaya pada daging reptil dapat dicapai melalui pemrosesan lebih lanjut dengan pemasakan. Hal ini diketahui bahwa proses pemasakan dapat cukup efektif untuk menonaktifkan bakteri dan parasit yang terdapat dalam daging reptil (Kadariya et al. 2014).

Selain itu penularan zoonosis dapat dicegah dengan penerapan konsep *One Health* yaitu suatu konsep kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan yang bersifat saling bersinergi satu sama lain atau interdependen untuk mencapai kesehatan global (Mackenzie & Jeggo 2019). Penerapan konsep *One Health* sebagai upaya pencegahan penularan zoonosis ini perlu diketahui oleh setiap individu terutama

individu yang menjadikan biawak sebagai hewan peliharaan. Biawak yang dipelihara dengan hewan peliharaan lain perlu diberikan terarium terpisah dan tidak dibiarkan berkeliaran bebas di dalam rumah untuk mengontrol pergerakan biawak guna mencegah kontaminasi antar hewan peliharaan maupun ke pemilik hewan (Corrente et al. 2017). Lebih lanjut, pemilik hewan perlu mengetahui praktek kebersihan yang baik selama penanganan dan pemeliharaan biawak. Praktek kebersihan seperti mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah kontak dengan hewan harus sering dilakukan agar dapat menghindarkan manusia dari penularan berbagai macam penyakit menular (Raksanagara & Raksanagara 2015) yang terdapat pada biawak. Selain itu, pembersihan terarium biawak juga harus rutin dilakukan dengan menerapkan praktek kebersihan yang baik dengan menggunakan sarung tangan dan disinfektan selama proses pembersihan terarium (Corrente et al. 2017).

Penularan zoonosis pada biawak juga dapat disebabkan oleh faktor pakannya. Secara umum, biawak merupakan hewan omnivora seperti *V. salvator* liar di Sri Lanka memakan ular kobra, ular tikus, telur merak, anak ayam, burung gagak, kura-kura, kepiting dan tikus serta daging sapi, daging babi dan daging buangan lainnya di tempat sampah (Karunarathna et al. 2012). Faktor pakan ini memicu potensi penularan penyakit dari pakan biawak terutama yang tidak higienis. Sehingga, untuk menghindarkan penularan zoonosis antara biawak peliharaan dengan pemilik diperlukan pemilihan pakan dengan standar kebersihan yang tinggi.

KESIMPULAN

Varanidae diketahui menjadi *host* dari berbagai organisme di dalam tubuhnya. Hal ini disebabkan karena habitatnya berada di sekitar perairan seperti rawa dan selokan, sehingga sangat memungkinkan terinfeksi berbagai organisme patogen terutama yang bersifat zoonosis. Beberapa mikroorganisme yang bersifat zoonosis yaitu dari kelompok bakteri terdapat *Salmonella* spp. dan *Anaplasma* spp. dan kelompok protozoa terdapat *Giardia* spp. dan *Cryptosporidium* sp. Kemudian terdapat bakteri zoonosis yang ditularkan melalui arthropoda seperti *Anaplasma* spp., *Rickettsia* spp., dan *Borrelia* spp. Selain itu, pada kelompok endoparasit juga terdapat parasit yang bersifat zoonosis yaitu *Ascaris* sp., *Strongyloides* sp., Pentastomida, dan *Angiostrongylus cantonensis*.

Pemanfaatan Varanidae yang banyak diperdagangkan tidak hanya sebagai hewan peliharaan eksotik tetapi juga dijadikan konsumsi dan obat memudahkan penularan penyakit zoonosis. Cara penanganan produk pangan asal hewan yang kurang

higienis dan kurang aseptis dapat menyebabkan potensi penularan organisme patogen (*foodborne disease*). Upaya pencegahan penularan dari *foodborne disease* dapat dilakukan dengan menerapkan *Good Hygienic Practices* (GHP) dengan proses pemasakan daging reptil yang akan dikonsumsi. Selain itu, penularan penyakit dapat dicegah dengan implementasi konsep *One Health* yaitu biawak ditempatkan pada terarium terpisah dari hewan lain, pembersihan terarium secara rutin dengan menerapkan praktek kebersihan, dan memberikan pakan dengan standar kebersihan yang tinggi pada biawak yang menjadi hewan peliharaan atau yang berada di penangkaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdel-Aziz A, Abou-Senna FM, Abdel-Gawad MA, El-Nour MFA. 2019. A new species of eimeria (Apicomplexa: Eimeriidae) from the desert monitor, *Varanus griseus griseus* (Lacertilia: Varanidae). Proceeding the 9th International Conference for Basic Sciences, Energy, Environment and Sustainable Development. Cairo, 27-29 Maret. 2017. Cairo (Egypt): Al-Azhar University.
- Agustin ALD, Koesdarto S, Lukiswanto BS, Suwanti LT, Arifin Z, Putranto ED. 2017. Morphological identification nematodes *Tanqua tiara* found on gastric *Varanus salvator* at East Java. The Veterinary Medicine International Conference 2017, KnE Life Sciences. Surabaya, 12-14 Juli. 2017. Surabaya (Indonesia): Universitas Airlangga. p. 668-676.
- Amelia KA, Ernawati R, Hastutiek P, Yunus M, Setiawan B, Sunarso A. 2020. Identification and ticks infestation pattern on monitor lizard (*Varanus salvator*, Byers, d. 2000). J Parasite Sci. 4:37-40.
- Ariel E. 2011. Viruses in reptiles. Vet Res. 42, art number 100.
- Arnafia W, Ningrum SG, Adj RS, Lukman DW, Pasaribu FH, Wibawan IWT. 2016. Isolation of *Salmonella* from reptiles in pet shop and its susceptibility to antibiotics in Indonesia. HVM Bioflux. 8:177-181.
- Auliya M, Koch A. 2020. Visual identification guide to the monitor lizard species of the world (genus *Varanus*). Bonn (Germany): Bundesamt für Naturschutz (BfN).
- Ball I. 2015. Tracking adenovirus infections in reptiles [Dissertation]. [Gießen (Germany)]: Justus-Liebig-Universität Gießen.
- Barboza T, Beaufre H. 2018. Epipterygoid bone salmonella abscess in a savannah monitor (*Varanus exanthematicus*). J Herpetologic Medic Surg. 28:29-33.
- Bennett D. 2015. International trade in the blue tree monitor lizard *Varanus macraei*. Biawak. 9:50-57.
- Bhadesiya CM, Patel VA, Gajjar PJ, Anikar, MJ. 2020. First record & clinical management of tick infestation by

- Amblyomma gervaisi, giardiasis and tail injury in a bengal monitor (*Varanus bengalensis*; Daudin, 1802) in Himmatnagar, Gujarat (India). *Int J Adv Res Biol Sci.* 7:71-74.
- Biru DMA, Detha AIR, Wuri DA. 2018. Kajian pemahaman peternak dan pelaku usaha produk pangan asal hewan tentang penyakit zoonosis dan pencegahannya di kota Kupang. *Jurnal Kajian Veteriner.* 6:85-111.
- Blake DP. 2015. *Eimeria* genomics: Where are we now and where are we going?. *Vet Parasitol.* 212:68–74.
- Bzdil J, Holy O, Toporcak J. 2017. *Salmonella enterica* subspecies enterica serovar paratyphi B as a disease-causing agent in reptiles in the Czech Republic. *Veterinarni Medicina.* 62:410–415.
- Chia M-Y, Jeng C-R, Hsiao S-H, Lee A-H, Chen C-Y, Pang VF. 2009. Entamoeba invadens myositis in a common water monitor lizard (*Varanus salvator*). *Vet Pathol.* 46:673-676.
- Cho ES, Jung SW, Jung H-D, Lee IY, Yong T-S, Jeong SJ, Kim HS. 2017. A case of pentastomiasis at the left maxilla bone in a patient with thyroid cancer. *Korean J Parasitol.* 55:433-437.
- Corrente M, Sangiorgio G, Grandolfo E, Bodnar L, Catella C, Trotta A, Martella V, Buonavoglia D. 2017. Risk for zoonotic Salmonella transmission from pet reptiles: A survey on knowledge, attitudes and practices of reptile-owners related to reptile husbandry. *Prevent Vet Medic.* 146:73-78.
- Doornbos K, Sumrandee C, Ruang-Arrerate T, Baimai V, Trinachartvanit W, Ahantarig A. 2013. Rickettsia sp. closely related to *Rickettsia raoultii* (Rickettsiales: Rickettsiaceae) in an *Amblyomma helvolum* (Acarina: Ixodidae) tick from a *Varanus salvator* (Squamata: Varanidae) in Thailand. *J Med Entomol.* 50:217-220.
- Eibach D, Krumkamp R, Al-Emran HM, Sarpong N, Hagen RM, Adu-Sarkodie Y, Tannich E, May J. 2015. Molecular characterization of Cryptosporidium spp. among children in rural Ghana. *PLoS Negl Trop Dis.* 9:1-12.
- Emerson YSY. 2012. First record of *Varanus bitatawa* in the Philippine pet trade. *Biawak.* 6:73.
- Galecki R, Sokół R, Dudek A. 2016. Tongue worm (Pentastomida) infection in ball pythons (*Python regius*) – a case report. *Ann Parasitol.* 62:363-365.
- Hanafiah M, Alfiansyah HD, Sayuti A. 2018. Identifikasi parasit pada biawak air (*Varanus salvator*). *Jurnal Sain Veteriner.* 36:24-31.
- Hashmi MUA, Khan MZ, Amtayaz, Ul Huda N. 2013. Current status, distribution and threats of varanus species (*Varanus bengalensis* & *Varanus griseus*) in Karachi & Thatta of Sindh. *Int J Fauna Biologic Stud.* 1:34-38.
- Hooshyar H, Rostamkhani P, Arbabi M, Delavari M. 2019. Giardia lamblia infection: Review of current diagnostic strategies. *Gastroenterol Hepatol Bed Bench.* 12:3-12.
- Hughes-Hanks JM, Schommer SK, Mitchell WJ, Shaw DP. 2010. Hepatitis and enteritis caused by a novel herpesvirus in two monitor lizards (*Varanus* spp.). *J Vet Diagn Invest.* 22:295–299.
- Huminto H, Agungpriyono DR. 2008. Deadly adenoviral infection in a lizard (*Varanus salvator*). *Proceeding of AZWMC.* Bogor, 19-22 Agustus 2008. Bogor (Indonesia). p. 40-41.
- Hyndman T, Shilton CM. 2011. Molecular detection of two adenoviruses associated with disease in Australian lizards. *Australian Vet J.* 89:232-235.
- Hyndman TH, Howard JG, Doneley RJT. 2019. Adenovirus in free-ranging Australian bearded dragons (*Pogona* spp.). *Vet Microbiol.* 234:72-76.
- Indraswari AAS, Suwiti NK, Apsari IAP. 2017. Protozoa gastrointestinal: *Eimeria auburnensis* dan *Eimeria bovis* menginfeksi sapi bali betina di Nusa Penida. *Buletin Vet Udayana.* 9:112-116.
- Jaleta TG, Zhou S, Bemm FM, Schar F, Khieu V, Muth, S, Odermatt P, Lok JB, Streit A. 2017. Different but overlapping populations of *Strongyloides stercoralis* in dogs and humans—Dogs as a possible source for zoonotic strongyloidiasis. *PLoS Negl Trop Dis.* 11:e0005752. doi: 10.1371/journal.pntd.0005752.
- Jho Y-S, Park D-H, Lee J-H, Cha S-Y, Han J-S. 2011. Identification of bacteria from the oral cavity and cloaca of snakes imported from Vietnam. *Laboratory Anim Res.* 27:213-217.
- Johny J, Kumar A, Kolar VV, Hamide A. 2018. Eosinophilic meningitis caused by consumption of meat of monitor lizard (*Varanus bengalensis*). *Neurol India.* 66:1166.
- Kadariya J, Smith TC, Thapaliya D. 2014. *Staphylococcus aureus* and Staphylococcal Food-Borne Disease: An ongoing challenge in public health. *BioMed Res Int.* 2014:1-9.
- Kaenkan W, Nooma W, Chelong I, Baimai V, Trinachartvanit W, Ahantarig A. 2019. Reptile-associated Borrelia spp. in Amblyomma ticks, Thailand. *Ticks Tick-borne Dis.* 11:1-23.
- Karunarathna DMSS, Amarasinghe AAT, Madawala MB, Kandambi HKD. 2012. Population status of two varanus species (Reptilia: Sauria: Varanidae) in Sri Lanka's puttalam lagoon system, with notes on their diet and conservation Status. *Biawak.* 6:22-33.
- Koch A, Ziegler T, Böhme W, Arida E, Auliya M. 2013. Pressing problems: Distribution, threats, and conservation status of the monitor lizards (Varanidae: Varanus spp.) of Southeast Asia and the Indo-Australian archipelago. *Herpetologic Conserv Biol.* 8:1-62.
- Koh FX, Panchadcharam C, Sitam FT, Tay ST. 2018. Molecular investigation of Anaplasma spp. in domestic and wildlife animals in Peninsular Malaysia.

- Vet Parasitol: Regional Studies and Report. 13:141-147.
- Kubiak M. 2013. Detection of agamid Adenovirus-1 in clinically healthy bearded dragons (*Pogona vitticeps*) in the UK. Vet Record. 172:475.
- Lin M, Kikuchi T, Brewer HM, Norbeck AD, Rikihisa Y. 2011. Global proteomic analysis of two tick-borne emerging zoonotic agents: *Anaplasma phagocytophilum* and *Ehrlichia chaffeensis*. Frontiers in Microbiology. 2:1-19. doi: 10.3389/fmicb.2011.00024.
- Mackenzie JS, Jeggo M. 2019. The one health approach-Why is it so important?. Trop Med Infect Dis. 4:88. doi: 10.3390/tropicalmed4020088.
- Maldonado Júnior A, Simões RO, Oliveira APM, Motta EM, Fernandez MA, Pereira ZM, Monteiro SS, Torres EJS, Thiengo SC. 2010. First report of *Angiostrongylus cantonensis* (Nematoda: Metastrongylidae) in *Achatina fulica* (Mollusca: Gastropoda) from Southeast and South Brazil. Memórias Do Instituto Oswaldo Cruz. 105:938-941. doi: 10.1590/s0074-02762010000700019.
- Manjunatha V, Rout M, Muniyellappa HK, Roopa S, Shivashankar BP, Byregowda SM. 2020. Pathological conditions associated with Physaloptera stomach worm infestation in bengal monitor lizard (*Varanus bengalensis*). Indian J Anim Res. 54:473-477.
- Marschang RE. 2011. Viruses infecting reptiles. Viruses. 3:2087-2126.
- Maryanti E. 2011. Epidemiologi kriptosporidiosis. J Ilmu Kedokteran. 5:1-6.
- Michael LM, von Dornberg K, Molnar V, Tappe D, Tannich E, Hewicker-Trautwein M, Wohlsein P. 2020. Entamoeba ranarum infection in a ball python (*Python regius*). J Comp Path. 179:74-78.
- Murphy D, Oshin F. 2014. Reptile-associated salmonellosis in children aged under 5 years in South West England. Arch Dis Child. 0:1-2.
- Nabarro L, Morris-Jones S, Moore DAJ. 2020. Arthropod-borne diseases. In: Peter's Atlas of Tropical Medicine and Parasitology. 7th ed. London (UK): Elsevier. p. 1-108.
- Nejsun P, Betson M, Bendall RP, Thamsborg SM, Stothard JR. 2012. *Ascaris suum* and *Trichuris suis*: looking to the future from an analysis of the past. J Helminthol. 86:148-155.
- Nijman V. 2016. Perceptions of sundanese men towards the consumption of water monitor lizard meat in West Java, Indonesia. Biawak. 10:22-25.
- Nikousefat Z, Javdani M, Hashemnia M, Rezaei F, Chalechale A. 2014. Hematology of a green iguana infected by Entamoeba invadense. Online J Vet Res. 18:851-858.
- Nowak M, Cieniuch S, Stanczak J, Siuda K. 2010. Detection of *Anaplasma phagocytophilum* in Amblyomma flavomaculatum ticks (Acari: Ixodidae) collected from lizard Varanus exanthematicus imported to Poland. Exp Appl Acarol. 51:363-371.
- Nurkarimah AB, Mufasirin, Damayanti R, Suwanti LT, Setiawan B, Suprihati E. 2020. Identification of protozoa in the blood and digestive tract on water monitor lizard (*Varanus salvator*). J Parasite Sci. 4:31-36.
- Odeyemi OA. 2016. Public health implications of microbial food safety and foodborne disease in developing countries. Food Nutr Res. 60:29819.
- O'Donoghue P. 2017. Haemoprotozoa: Making biological sense of molecular phylogenies. Int J Parasitol: Parasites and Wildlife. 6:241-256.
- Pavlassek I, Ryan U. 2008. Cryptosporidium varanii takes precedence over C. saurophilum. Experiment Parasitol. 118:434-437.
- Pees M, Rabsch W, Plenz B, Fruth A, Prager R, Simon S, Schmidt V, Münch S, Braun PG. 2013. Evidence for the transmission of Salmonella from reptiles to children in Germany, July 2010 to October 2011. Euro Surveill. 18:1-11.
- Pénzes JJ, Szivovics L, Harrach B. 2020. The complete genome sequence of bearded dragon adenovirus 1 harbors three genes encoding proteins of the C-type lectin-like domain superfamily. Infect Genet Evol. 83:1-12.
- Prado-Irwin SR, van de Schoot M, Geneva AJ. 2018. Detection and phylogenetic analysis of adenovirus occurring in a single species. Peer J. 6:1-18.
- Putri BR, Suprihati E, Yunus M, Koesdarto S, Suwanti LT, Kusnoto. 2020. Morphology of surface ultrastructure of Duthiersia expansa (Cestoda: Diphyllorhynchidae) from water lizards (Varanus salvator) from Sidoarjo, Indonesia. J Phys: Conf Ser. 1430 012014:1-6.
- Raksanagara AS, Raksanagara A. 2015. Perilaku hidup bersih dan sehat sebagai determinan kesehatan yang penting pada tatanan rumah tangga di Kota Bandung. Jurnal Sistem Kesehatan. 1:30-34.
- Reeves WK, Durden LA, Dasch GA. 2006. A spotted fever group rickettsia from an exotic tick species, Amblyomma exornatum (Acari: Ixodidae), in a reptile breeding facility in the United States. J Med. Entomol. 43:1099-1101.
- Ryan U, Fayer R, Xiao L. 2014. Cryptosporidium species in human and animals: current understanding and research needs. Parasitology. 141:1667-1685.
- Ryan U, Hijjawi N. 2015. New developments in Cryptosporidium research. Int J Parasitol. 45:367-373.
- Scheelings TF, Jessop TS. 2011. Influence of capture method, habitat quality and individual traits on blood parameters of free-ranging lace monitors (Varanus varius). Australian Vet J. 89:360-365.

- Shilton CM, Šlapeta J, Shine R, Brown GP. 2018. Invasive colonic entamoebiasis in wild cane toads, Australia. *Emerg Infect Dis.* 24:1541-1543.
- Shin SP, Kim JH, Gomez DK, Choresca CH, Han JE, Park SC. 2009. Isolation and characterization of *Morganella morganii* from asian water monitor *Varanus salvator*. *J Vet Clin.* 26:391-394.
- Sparks H, Nair G, Castellanos-Gonzalez A, White Jr. AC. 2015. Treatment of cryptosporidium: What we know, gaps, and the way forward. *Curr Trop Med Rep.* 2:181-187.
- Subroto AY, Sardjana IKW, Sukmanadi M, Poetranto ED, Kusnoto, Sunarso A. 2020. Identification of pentastomide parasites in consumed water lizard (*Varanus salvator*). *J Parasite Sci.* 4:41-44.
- Subramanean J, Reddy MV. 2012. Monitor lizards and geckos used in traditional medicine face extinction and need protection. *Curr Sci.* 102:1248-1249.
- Supriyono, Takano A, Kuwata R, Shimoda H, Hadi UK, Setiyono A, Agungpriyono S, Maeda K. 2019. Detection and isolation of tick-borne bacteria (*Anaplasma* spp., *Rickettsia* spp., and *Borrelia* spp.) in *Amblyomma varanese* ticks on lizard (*Varanus salvator*). *Microbiol Immunol.* 63:328-333.
- Tomastikova Z, Romero SB, Knotek Z, Karpiskova R. 2017. Prevalence and characteristics of *Salmonella* species from captive reptiles in the Czech Republic. *Veterinarni Medicina.* 62:456-469.
- Uyeda L, Iskandar E, Purbatrapila A, Pamungkas J, Wirsing A, Kyes R. 2014. Water monitor lizard (*Varanus salvator*) satay: A treatment for skin ailments in muarabinuangeun and cisiih, Indonesia. *Biawak.* 8:35-38.
- Wellehan JFX, Johnson AJ, Latimer KS, Whiteside DP, Crawshaw GJ, Detrisac CJ, Terrell SP, Heard DJ, Childress A, Jacobson ER. 2005. Varanid herpesvirus 1: a novel associated with proliferative stomatitis in green tree monitors (*Varanus prasinus*). *Vet Microbiol.* 105:83-92.
- Widisuputri NKA, Suwanti LT, Plumeriastuti H. 2020. A Survey for zoonotic and other gastrointestinal parasites in pig in Bali Province, Indonesia. *Indones J Trop Infect Dis.* 8:55-66. doi: 10.20473/ijtid.v8i1.10393.
- Wozniakowski G, Samorek-Salamonowicz E. 2015. Animal herpesviruses and their zoonotic potential for cross-species infection. *Ann Agric Environ Medic.* 22:191-194.